Ampliación de Matemáticas

Grupo 16 de 1º de Ciencias Ambientales, 10 de septiembre de 2007, examen.

Ejercicio 1.- Dada la ecuación diferencial

$$\frac{dx}{dt} = tx - t^3,$$

Hallar la solución que satisface $x(0) = 5$.

Respuesta.-

$$x(t) = 2 + t^2 + 3e^{\frac{t^2}{2}}.$$

Ejercicio 2.- Hallar la solución

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$$

del sistema de ecuaciones diferenciales lineales

$$\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \\ x'_2 = -10x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ x'_3 = 10x_1 - x_2 - 3x_3 \end{cases}$$

que satisface las condiciones iniciales $x_1(0) = -2, x_2(0) = 3, x_3(0) = 2$.

Respuesta.-

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7e^{3t} + 5e^t \\ 14e^{3t} - e^{-2t} - 10e^t \\ -14e^{3t} + e^{-2t} + 15e^t \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 3.- (2,5 puntos) Decir si las tres funciones $f_1(t), f_2(t), f_3(t)$ representadas gráficamente en la Figura 1 son linealmente independientes en el intervalo $[a, b]$.

Figura 1: Funciones $f_1(t), f_2(t), f_3(t)$.

Ejercicio 4.- (2,5 puntos)

- (a) Calcular los valores propios y vectores propios de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -10 & 2 & 4 \\ 10 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- (b) Consideremos la sucesión de puntos $P_k = (x_k, y_k, z_k)$, $k = 0, 1, 2, \dots$ del espacio definida por las relaciones de recurrencia

$$\begin{cases} x_{k+1} = 3x_k - 2y_k - 2z_k, \\ y_{k+1} = -10x_k + 2y_k + 4z_k, \\ z_{k+1} = 10x_k - y_k - 3z_k \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

entre las coordenadas del punto P_k y las de P_{k+1} , así como por el punto inicial P_0 .

- Demostrar que, cualquiera que sea P_0 , los puntos

$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_k, P_{k+1}, \dots$$

son coplanarios (es decir, que están en un mismo plano).

- Llamemos $\pi(P_0)$ al plano que contiene los puntos

$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_k, P_{k+1}, \dots$$

Sea $P'_0 = (x'_0, y'_0, z'_0)$ cualquier otro punto inicial y denotemos por $\pi(P'_0)$ al plano que contiene los puntos

$$P'_0, P'_1, P'_2, \dots, P'_k, P'_{k+1}, \dots$$

donde $P'_k = (x'_k, y'_k, z'_k)$ y $P'_{k+1} = (x'_{k+1}, y'_{k+1}, z'_{k+1})$ están ligados por las relaciones de recurrencia

$$\begin{cases} x'_{k+1} = 3x'_k - 2y'_k - 2z'_k, \\ y'_{k+1} = -10x'_k + 2y'_k + 4z'_k, \\ z'_{k+1} = 10x'_k - y'_k - 3z'_k \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Demostrar que los planos $\pi(P_0)$ y $\pi(P'_0)$ son paralelos.

Duración: 4 horas.